



Instrucciones después de una biopsia de Seno

1. Una bolsa de hielo será aplicada en el lugar de la biopsia mientras se encuentra en la Unidad de Reanimación Postanestesia (PACU por sus siglas en inglés). Cuando llegue a casa, vuelva a colocarse una bolsa de hielo por 30 minutos.
2. Quítese el vendaje 24 horas después de la biopsia.
3. Mantenga seco durante 24 horas el lugar donde se hizo la biopsia hasta que se retire el vendaje. Después de 24 horas, el lugar ya se puede mojar. No se restrigie el área.
4. Si tiene puestas curas blancas de papel ("Steri-Strips"), deje que se caigan por sí solas. Esto ocurre generalmente entre 7 y 10 días. Si tiene suturas y puntos haga una cita con el Dr. Danforth para retirar o sacar los puntos.
5. Si siente dolor, tome Tylenol, Motrin o Advil conforme se lo prescribió su médico por 3 días. Llame a su cirujano si el dolor persiste por más de 3 días.
6. No realice actividades extenuantes (como trotar, aeróbicos, tenis) durante una 1 semana.
7. Si hay enrojecimiento, secreciones provenientes del lugar de la incisión, fiebre o escalofríos, comuníquese con el personal médico.

Otras instrucciones:

Contactos (Comuníquese con los miembros del personal que hay en la lista de abajo llamando al operador de buscapersonas de los NIH al **301-496-1211**).

Su médico:



2005

¿Tiene preguntas acerca del Centro Clínico? OCCC@cc.nih.gov

Esta información está preparada específicamente para los pacientes que participan en la investigación clínica en el Centro Clínico en los Institutos Nacionales de Salud y no es necesariamente aplicable a los individuos que son pacientes en otra parte. Si tiene alguna pregunta acerca de la información presentada aquí, hable con un miembro de su equipo de atención médica.

En donde sea aplicable, los nombres patentados de productos comerciales se proporcionan solamente como ejemplos ilustrativos de productos aceptables y no implica un respaldo por parte del NIH para dichos productos; ni tampoco el hecho de que el nombre de un producto de patente en particular no se identificó implica que dicho producto no sea satisfactorio.

El Centro Clínico de los
Institutos Nacionales de Salud
Bethesda, MD 20892